



LUMBALNA PUNKCIJA:

Lumbalna punkcija je invazivna dijagnostička metoda koja se izvodi na donjem dijelu leđa, u lumbalnoj regiji, radi uzimanja uzorka cerebrospinalne tekućine – likvora.

Metoda se najčešće koristi u svrhu dijagnostike, ali se ponekad koristi i u liječenju određenih bolesti (intratekalna kemoterapija, u anesteziji davanje analgezije itd). Lumbalna punkcija može pomoći u dijagnosticiranju meningitisa, encefalitisa i meningoencefalomijelitisa; krvarenja oko mozga, određenih vrsta malignih bolesti koje zahvaćaju mozak i leđnu moždinu ili kod određenih upalnih stanja živčanog sustava kao što su multipla skleroza i Guillain-Barre sindrom.

Postupak snimanja:

- Postupak obično traje oko 15 minuta i ne zahtjeva opću anesteziju.
- Prije lumbalne punkcije potrebno je pacijenta namjestiti u odgovarajući položaj za punkciju.
- Nakon lumbalne punkcije potrebno je mirovati oko 2h.
- Lumbalna punkcija nije bolan postupak i komplikacije su rijetke (najčešća komplikacija je tzv. postpunkcijska glavobolja koja se javlja zbog curenja likvora u periferno tkivo i obično traje nekoliko sati do maksimalno 7 dana nakon punkcije).